décembre 2021

L'IRME

Éditorial

L'IRME veut promouvoir les techniques de réhabilitation des patients paraplégiques ou tétraplégiques à la suite d'un traumatisme médullaire qui semblent les plus prometteuses à la suite d'essais cliniques scientifiquement reconnus.

1 la neurostimulation : cette technique a été initialement proposée pour traiter les problèmes sphinctériens, sexuels, ou les douleurs neuropathiques.

À partir de là, la Lion Procédure du Pr Possover a été mise au point : elle consiste à mettre en place des électrodes de stimulation au contact du nerf sciatique et du nerf fémoral de chaque côté par une laparoscopie (intervention qui consiste à introduire par une incision un appareil de vision à l'intérieur de la cavité abdominale puis de mettre en place les électrodes).

Les stimulations continues de ces nerfs par l'intermédiaire des électrodes, stimulations obtenues par l'intermédiaire d'un boîtier implanté sous la peau et actionné grâce à une télécommande, ont permis d'obtenir une récupération motrice chez des patients paraplégiques depuis plus d'un an.

En effet sur un groupe de patients implantés, progressivement des contractions musculaires sont apparues, permettant des mouvements des membres inférieurs puis la possibilité de se tenir debout et de marcher dans des barres parallèles avec aides techniques puis sans aide technique.

Ce groupe était comparé à un groupe témoin qui n'avait pas d'électrodes implantées sur les nerfs sciatiques et fémoraux et qui n'a pas obtenu cette récupération ; ces résultats sont très prometteurs.

Cette stimulation était associée à une rééducation intense consistant en cinq sessions de rééducation par semaine.

Il n'y a pas actuellement d'explication scientifique pour expliquer cette récupération ; deux hypothèses sont possibles :

- la stimulation directe des nerfs, associée à la rééducation active, entraîne une repousse axonale qui permet cette récupération
- le centre automatique de la marche dont l'existence est prouvée chez l'animal et qui a permis que beaucoup d'études expérimentales aient abouti à une récupération, et dont on pensait que chez l'homme il était atrophié, existe en fait à l'état latent et est réactivé par la neurostimulation.

IRME
Institut pour la recherche sur la moelle épinière et l'encéphale
25, rue Duranton - 75015 Paris - France
Téléphone : +33(0) 1 44 05 15 43 - E-mail : irme@noos.fr
www.irme.org

SOUTIEN

Le Fonds d'Entraide GMF renouvelle en 2021 sa confiance à l'IRME et soutient une collaboration dans l'étude de l'encéphalopathie chronique traumatique du sportif.

Tous nos remerciements également à **Farida Sabatier** (photo ci-dessus), qui a décidé de soutenir la recherche en organisant une collecte lors des obsèques de son époux. Le Pr Ricard est allé à sa rencontre, devant le château de Rambouillet.

C'est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de Bernard Delannoy, trésorier de l'association **Titoine un combat pour l'espoir**. Noella, Présidente de l'association poursuit ses actions avec les tricoteuses et nous les remercions très vivement.

➔ **L'Assemblée générale s'est tenue le 30 juin 2021, consultez le compte-rendu sur notre site www.irme.org**

La lettre de l'IRME
Comité de rédaction : Pr François Clarac, Pr Marc Tadié, Sophie Blancho - Maquette : Sophie Boscardin - Impression : Poivre rose.

De nouvelles échelles pour de nouvelles perspectives de prise en charge

Les évaluations traditionnelles des nouveaux traitements sont basées sur des paramètres purement cliniques, physiologiques, biologiques, ou encore d'imagerie. Dans le cas des traumatismes médullaires, le médecin va établir un score sur une échelle appelée ISNCSCI (anciennement score ASIA) à partir de l'examen des fonctions motrices et sensibles du patient.

Si ces évaluations sont indispensables, on reconnaît maintenant dans tous les domaines de la médecine la nécessité d'autres types de résultats qui ne peuvent être évalués que du point de vue du patient lui-même.

L'agence du médicament américaine (la FDA) définit ainsi les « Patient Reported Outcome » comme « toute mesure de l'état de santé du patient qui est rapportée directement par le patient, sans interprétation du médecin ou d'une tierce personne ». Elles se sont développées de façon exponentielle depuis les années 90, en particulier dans le monde anglo-saxon et dans le domaine de la cancérologie. Il s'agit le plus souvent de questionnaires qui ont été construits grâce à la participation des patients afin de pouvoir sélectionner les domaines de leur santé et de leur vie quotidienne qu'il faut évaluer. Il y a encore un retard important dans le domaine des traumatismes médullaires et c'est un travail indispensable pour quantifier l'apport dans la vie réelle des nouvelles stratégies thérapeutiques. Il ne pourra être réalisé que grâce à un très fort partenariat entre les patients, leurs aidants et les médecins impliqués dans la prise en charge des traumatismes médullaires. ■

Dr Pierre François Pradat

L'IRME souhaite donc faciliter cette application en France chez les paraplégiques, en suscitant des programmes de recherche utilisant l'IRM fonctionnelle pour comprendre le mécanisme d'action et mettre au point la technique de neurostimulation chez des patients tétraplégiques pour essayer de redonner des mouvements des membres supérieurs et notamment de la main.

2 la rééducation assistée par exosquelette: un exosquelette qui permet aux patients paraplégiques de se mettre debout et d'avancer sans aide technique a été mis au point par une société française. L'IRME souhaite promouvoir des programmes de recherche quantifiant les bénéfices éventuels sur la mobilité, sur la spasticité, sur les douleurs neuropathiques, sur les fonctions digestives et urinaires, de l'utilisation régulière de cet exosquelette. Pour cela l'IRME veut initier un centre de marche où, sous contrôle médical de neurologues et rééducateurs, ce robot serait utilisé chez des patients volontaires qui bénéficieraient régulièrement de bilans pour évaluer les éventuelles retombées bénéfiques et proposer de nouvelles recommandations de prise en charge pour une rééducation intense.

Dans ce centre de marche seraient également mis à disposition les outils de rééducation les plus modernes.

3 les biomatériaux: différents biomatériaux ont été utilisés depuis des années pour tenter de diminuer la cicatrice gliale. Parmi eux, le collagène d'une part et le Chitosan d'autre part ont montré dans les études précliniques qu'ils possédaient des propriétés permettant de favoriser la repousse axonale. Ils ont surtout montré leur faculté à s'intégrer dans une moelle traumatisée et à servir de support à des cellules ou à des substances médicamenteuses: c'est la raison pour laquelle l'IRME souhaite faire progresser un essai clinique utilisant cette technique.

4 la thérapie cellulaire: il s'agit principalement de l'utilisation de cellules souches. En effet des études récentes ont mis en évidence chez l'être humain que l'injection de cellules souches obtenues par ponction de moelle osseuse chez le patient lui-même et réinjectées au niveau d'une lésion traumatique de la moelle épinière permettait d'obtenir une récupération motrice permettant aux patients de se mettre debout et de faire quelques pas.

En collaboration avec les équipes de l'IRME qui ont travaillé sur ce sujet depuis des années, nous souhaitons promouvoir un essai clinique dans ce domaine: en effet les résultats publiés à ce jour sont des études portant sur quelques cas isolés et ne permettent donc pas pour l'instant d'affirmer scientifiquement qu'il s'agit d'une technique autre que prometteuse.

5 la prise en charge des blessés médullaires : l'IRME s'est toujours attaché à ce qu'un réseau de prise en charge coordonnée des blessés médullaires soit effectif sur l'ensemble des territoires. Cette prise en charge dont les points les plus importants avaient été mis en place par notre institut il y a plusieurs décennies comporte : savoir suspecter une lésion médullaire chez une victime sur les lieux de l'accident et la transporter immobilisée par une minerve et un matelas coquille; restaurer et maintenir une tension artérielle moyenne supérieure à 90 mm de mercure; transférer le plus rapidement possible dans un centre comportant un service de réanimation, un service d'imagerie capable de réaliser en urgence un scanner et si possible une IRM, un service de chirurgie pouvant décompresser et stabiliser la colonne vertébrale et la moelle au mieux dans les six heures qui suivent l'accident et sinon au moins dans les 24 heures et une coordination avec un service de rééducation fonctionnelle apte à accueillir le blessé dès que son état est stabilisé.

Une nouvelle étude prospective sur la prise en charge des blessés médullaires est indispensable pour individualiser avec l'aide des sociétés savantes des centres de référence pouvant accueillir ces traumatisés 24 heures sur 24 et ainsi que chaque nouveau traumatisé ait les mêmes chances de voir ses lésions limitées au maximum quel que soit le lieu de son accident.

6 Où en sont les thérapeutiques innovantes visant à diminuer le second mécanisme cytotoxique qui se produit dans les heures qui suivent l'accident ? Si actuellement aucune molécule n'a prouvé son efficacité, nous demeurons convaincu qu'une association des molécules qui individuellement ont montré une tendance à l'efficacité pourraient être la solution : parmi celles-ci, l'association de corticoïdes avec la Minocycline et la vitamine D pourrait avoir un rôle neuroprotecteur. Pour pouvoir réaliser une étude préclinique de cette association, nous avons besoin de réunir des fonds car l'industrie pharmaceutique est toujours réticente à promouvoir des études associant des produits de différents laboratoires. ■

“ Chers amis de l'IRME, plus que jamais nous avons besoin de votre générosité pour pouvoir mettre en application les techniques dont l'efficacité nous paraît scientifiquement certaine mais qui demande à être certifiée par quelques études complémentaires avant de pouvoir être appliquées au plus grand nombre. ”

De l'animal à la clinique

Résultat de l'équipe de l'**Université de Rouen Normandie** - EA3830 « *Groupe de Recherche sur le Handicap Ventilatoire* »,
Dr Nicolas Guerout et Pr Jean-Paul Marie

Dans la lésion médullaire (SCI), le cerveau se trouve déconnecté partiellement ou complètement de la périphérie. Le laboratoire EA3830 a démontré que chez les souris, la stimulation magnétique répétitive (rTMS) peut, après traumatisme médullaire, moduler la cicatrice au niveau de la lésion et induire ainsi une récupération fonctionnelle locomotrice et ce de manière non invasive. Ces résultats prometteurs ont également été validés chez le rat, modèle animal dans lequel les SCI conduisent à la formation de cavités kystiques qui sont dépourvues de cellules. Les résultats démontrent que la rTMS, dans deux modèles de SCI (contusion et transection), module la cicatrice notamment en diminuant la formation de ces cavités kystiques et en améliorant la survie axonale. De plus, la rTMS, dans ces deux modèles, améliore la récupération locomotrice fonctionnelle.

La suite des travaux de ce laboratoire concernant la stimulation magnétique, traitement qui présente un réel intérêt clinique est donc maintenant en discussion avec le service de neurochirurgie du CHU de Rouen dirigé par le Pr Stéphane Derrey.

Photos (de gauche à droite)

1 - Images montrant l'implantation chirurgicale d'un petit réseau d'électrodes avec une palette à trois colonnes (5-6-5) et 16 contacts (Medtronic) au niveau vertébral C4-7 sur le côté paralysé (à gauche).

2 - IRM © smart.art - Fotolia.com

3 - Scanner de la colonne vertébrale © CLIPAREA.com - Fotolia.com

4 - Vertèbres © MAST - fotolia by Adobe